



Le Faucon pèlerin est connu pour son mode de chasse. Il atteint la vitesse de 200km/h lors des piqués qu'il effectue pour capturer ses proies en vol.

Directive Oiseaux : **annexe I**

A103

Faucon pèlerin

Falco peregrinus – Falco pelegrini

Nombre de couples sur le site : 1-2

Hiérarchisation: 5

Valeur patrimoniale

Statut européen :

Directive Oiseaux (annexe I)
Convention de Berne (annexe II)
Convention de Bonn (annexe II)
Liste rouge Europe : Non menacé

Statut national :

Liste rouge nationale : Non menacé

Statut régional :

Liste rouge : En Déclin

Répartition

En Europe :



En France et en LR :

En France, le Faucon pèlerin est principalement présent au sud d'un axe Ardennes - Pays basque. En Languedoc-Roussillon, le pèlerin est présent dans tout l'arrière-pays montagneux, des Pyrénées à la Margeride.

Sur le site :

cf. carte ci-après

Morphologie

Le Faucon pèlerin est un des plus grands faucons européens. Rapace de taille moyenne, il s'identifie à son corps puissant et fuselé, sa large poitrine et ses ailes en forme de faux. Sa silhouette « massive » est caractéristique en vol avec des ailes pointues et une queue courte. L'espèce est plutôt silencieuse, excepté à proximité de son nid, où elle peut émettre des cris d'alarme stridents. La femelle est plus grande et plus lourde que le mâle.

Ecologie de l'espèce

- Habitat : Grandes vallées encaissées avec falaises.
- Alimentation : Oiseaux chassés en vol, parfois chauve-souris.
- Reproduction [mars-juin]: L'aire est placée dans une grande falaise, ponte est de 3 à 4 oeufs dans une anfractuosité, sur un nid sommaire, parfois à même le sol. Le couple se cantonne dès le mois de janvier.
- Migration : Sédentaire. Des oiseaux du nord de l'Europe hivernent en France.

Habitats utilisés sur le site

Le Faucon pèlerin n'est pas lié à un habitat en particulier. La présence de falaises suffisamment hautes et tranquilles ainsi que la richesse du territoire en espèces-proies (oiseaux) sont les seuls éléments déterminant sa présence. Il est assez communément observé sur l'intégralité du site mais sa reproduction n'est régulière que sur la partie ouest. Plus à l'est, le manque de sites de reproduction adéquats et/ou la présence du Grand-duc, concurrent naturel de l'espèce, limitent sa présence.

Effectifs nicheurs et tendance démographique sur le site

Un couple de Faucon pèlerin se reproduit régulièrement à l'ouest du site Natura 2000 mais semble changer régulièrement de site de nidification. A l'est, malgré des observations très régulières, sa reproduction n'a pas été prouvée. Faute d'étude antérieure, la tendance démographique de cette petite population est inconnue.

Etat de conservation

■ En France :

En l'espace de deux décennies, les populations des pays industrialisés de l'hémisphère nord ont diminué de 90 %. En France, ce déclin s'est interrompu dans le courant des années 1970. Une augmentation de l'effectif nicheur est constatée depuis une vingtaine d'années.

	Effectif (en couples)	%
Effectif européen*	7 500-9 000	-
Effectif français	1 000-1 400	15%
Effectif régional	75-115	7-8%
Effectif départemental	11-20	9 à 26%

* Turquie et Russie non comprises

■ Sur le site :

« Moyen » à « favorable » pour l'espèce et ses habitats

Etudes à développer

Suivi de la productivité du couple nichant dans le massif et recherche de nouveaux couples.

Menaces pesant sur l'espèce et ses habitats


- **Dérangement humain** aux alentours des sites de reproduction
- **Electrocution et collision** sur le réseau électrique Moyenne Tension
- **Traitements phytosanitaires** affectant ses espèces-proies (oiseaux)

Mesures de gestion favorables

- **Neutraliser les lignes électriques dangereuses**
- **Limiter la fréquentation humaine** autour des nids entre décembre et mai
- **Limiter la pratique des sports de pleine nature** (escalade) sur les sites favorables **entre novembre et mai**
- **Limiter les traitements phytosanitaires**
- **Prendre en compte les habitats du Faucon pèlerin dans tout projet d'aménagement**

Responsabilité sur le site

Le Faucon pèlerin étant encore assez répandu en France et en Languedoc-Roussillon, la responsabilité sur le site pour cette espèce est faible : **Note=4/14.**



Bibliographie indicative

BIRDLIFE International, 2004 - GARRIGUE J., 2006 - MONNERET R.-J., 1999 - MONNERET R.-J., 2004. - POMPIDOR JP., 2004 - GALVEZ M., 2004 - MERIDIONALIS, 2004 - MERIDIONALIS, 2009