

Etat de conservation sur le site

Habitat très fragmentaire

Critères d'appréciation :

Structure :

- Plus de 20% de plantes en rosette : note B
- % de recouvrement ligneux note A si < 20%, B si 20-40%, C si > 40%

Evolution : selon contexte associé, note A si environnement ouvert, B si contexte de fermeture léger ou arbustif, C si ceinture arborée et fourrés fermés

Restauration : composition des ligneux note B si callune ou genévrier, C si piquetage forestier par Houx ou autre.

Etudes à développer

- Suivre l'évolution de cet habitat étant donné qu'il se trouve en limite de son aire de répartition.

Hiérarchisation patrimoniale

Enjeu modéré

Intérêts socio-économiques


Valeur pastorale
Valeur paysagère

Menaces existantes ou potentielles

Régression des surfaces par fermeture avec les fourrés arbustifs.

Mesures de gestion favorables

Maintenir l'état ouvert en préservant la diversité floristique par le maintien d'un pâturage extensif en synergie avec un débroussaillage de la lande qui colonise.



Bibliographie

- Collectif, 2002 - Cahier d'habitats, Tome 4, Habitats agropastoraux
- VIGO J., 1979 – Les pastures acidophiles muntanes (Chamaespartio-Agrostidenion nova subaliansa) de les comarques humides de Catalunya. Acta geològica hipànica, t.14 : 534-538. Departament Departament de botànica, Facultat de biologia, Universitat de Barcelona.
- Braun-Blanquet J. et al., 1952 – Les groupements végétaux de la France méditerranéenne
- Collectif, 2004. Prodrome des végétations de France. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 171 p. (Patrimoines naturels, 61)
- Directive 92/43/CEE du conseil du 21 Mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- DIREN Languedoc-Roussillon, 2008. Liste d'espèces déterminantes des ZNIEFF du Languedoc-Roussillon.
- CNRS. Paul Lechevalier. Paris. Bissardon M., Guibal L. & Rameau J-C., 1997. Corine biotopes, types d'habitats français, ENGREF-ATEN, 175 p. dernières mise à jour : 4 avril 2005